



Come utilizzare Erbavoglio® Hi Turf.

A) Preparazione del terreno

Diserbo

Diserbare con prodotto non selettivo la vegetazione esistente:

- ✓ utilizzare un diserbante con principio attivo “GLIPHOSATE” secondo le dosi ed i tempi riportati sul prodotto, il tappeto erboso preesistente deve essere asciutto;
- ✓ Non irrigare. In caso di pioggia entro 24/36 ore occorre ripetere l'operazione poiché l'acqua piovana dilava il prodotto;
- ✓ Dopo 5 giorni dal trattamento effettuare un taglio bassissimo e asportare il materiale vegetale.

Preparazione del terreno

1. Lavorare i primi 10/15 cm del terreno (motocoltivatore, fresa, erpice, vanga, ecc.)
2. Rastrellare il terreno lavorato per livellare il terreno.
3. Distribuire 30g/m² di concime ternario con buon titolo di fosforo (P) facilmente reperibile presso un garden o un'agraria.

Trapianto di Erbavoglio® Hi Turf

1. Densità di trapianto minima: 16 piante per metro quadrato.
 - a. Opzione 1) Bucare con un punzonatore o cavicchio la superficie e alloggiarvi le piantine.
 - b. Opzione 2) Fare dei solchi profondi 4-5 centimetri con un attrezzo da giardinaggio (distanza 20/25 cm tra i solchi) e collocare le piante all'interno del solco, poi richiuderlo con un rastrello.
2. Rullare o pressare bene le piante in modo che il pane di torba aderisca bene al terreno.
3. Irrigare abbondantemente la superficie (con la prima irrigazione si deve quasi allagare la superficie).

B) Dalle piantine al tappeto erboso: la fase di crescita

Irrigazione

- ✓ Dal giorno dopo il trapianto fino alla completa copertura della superficie irrigare quotidianamente, o più in generale mantenere umida la superficie del terreno. Si consideri che:
 - Un'irrigazione eccessiva porta alla formazione di una pellicola nerastra sulla superficie (il ristagno danneggia la buona crescita delle piante);
 - Un'irrigazione insufficiente porta a una minor velocità di accrescimento;
- ✓ A tappeto erboso maturo (superficie coperta) irrigare una/due volte a settimana ma con sessioni di irrigazione più lunghe (più acqua per irrigazione).

Concimazione

Fino alla completa copertura della superficie concimare ogni settimana, dosi consigliate:

- a. se il titolo di N (azoto) è oltre 30: distribuire 15g/m²,
- b. se il titolo di N (azoto) è tra 10 e 20: distribuire 30g/m².

Taglio

Mantenere l'altezza delle piantine intorno ai 3 centimetri, iniziare a tagliare dopo tre settimane dal trapianto.

Controllo delle infestanti

- a. Manuale, consigliato per le piccole superfici (50/100 mq);
- b. Chimico (per le grandi superfici):
 - Trattamento preventivo: utilizzo di prodotti con principio attivo *Oxadiazone* secondo dosi e tempi indicati sul prodotto,
 - Trattamento dopo la comparsa delle infestanti: utilizzo di prodotti selettivi per "foglia larga" con principio attivo *Dicamba* secondo dosi e tempi indicati sul prodotto.